



新竹科學工業園區員工診所 公告

公告日期 中華民國 104 年 06 月 04 日

收件者 保健合約廠商

承辦單位 保健組

主旨 防範因應避免感染中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)

說明

世界衛生組織 (WHO) 於 2012 年 9 月公布全球第一例中東呼吸症候群冠狀病毒感染症病例，已在沙烏地阿拉伯、約旦、卡達、英國、德國、法國等國陸續發現確診病例，部分國家出現可能人傳人的群聚感染事件。中東呼吸症候群冠狀病毒於 2012 年 9 月首次從人類體內分離出來，確定病例的症狀主要是發生急性的嚴重呼吸系統疾病，症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難。從目前少數幾位病例的臨床資料顯示，感染者通常會有肺炎，部分病人會出現腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血 (DIC) 或死亡。

※傳播方式：

一般冠狀病毒主要透過大的呼吸道飛沫顆粒，以及直接或間接接觸到感染者分泌物等方式傳播，但 MERS-CoV 確實傳播途徑仍不明。根據目前研究結果推測，個案可能因接觸或吸入患病駱駝之飛沫或分泌物而感染，人與人間的傳播主要以院內感染為主，但仍無持續性人傳人的現象。另曾有研究指出 MERS-CoV 病毒可在低溫(4°C)的駱駝生乳存活 72 小時，部分確診病例亦曾飲用駱駝乳。

※潛伏期：

2-14 天。

※發病症狀：

確定病例的症狀主要是發生急性的嚴重呼吸系統疾病，症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難。從目前少數幾位病例的臨床資料顯示，感染者通常會有肺炎，部分病人會出現腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血 (DIC) 或死亡。

※預防接種建議：

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症目前尚無有效可施打之疫苗。

※治療方法與就醫資訊：

最近曾至疫區旅遊的民眾，如出現呼吸道症狀或有發燒症狀則應佩戴一般外科口罩並儘速就醫，主動告知醫護人員旅遊史。醫師如發現急性不明原因肺炎 (排除已知感染) 且發病前 14 日曾赴疫區的病患，應儘速通報衛生機關，並依院內感染控制指引加強醫院感控措施。

※疾管署呼籲：

請注意個人衛生、呼吸道防護及手部清潔！前往疫區請提高警覺，儘量減少至人群聚集或空氣不流通的地方活動，或與有呼吸道症狀者密切接觸。此外應避免前往當地農場、接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶，以降低受感染可能性；於返國時若出現發燒、類流感、腹瀉等症狀，應主動告知機場港口檢疫人員，戴上口罩儘速就醫，並告知接觸史及旅遊史，以利醫師及早診斷，及早提供妥適的治療。

※相關資訊請參閱疾管署「MERS-CoV 專區」(<http://www.cdc.gov.tw>)，或撥打民眾疫情通報及諮詢專線 1922 洽詢

※新竹地區應變醫院/隔離醫院如下:

	新竹市	新竹縣
應變醫院	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院
隔離醫院	新竹分院財團法人馬偕紀念醫院 新竹分院 國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院	東元綜合醫院 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院

※緊急救護接獲疑似個案，後送醫院以國立台灣大學醫學院新竹分院為主，員診救護車到廠區就醫流程如下附件供參。


※員工診所提供以下防疫物品供會員參考

品項	外觀	合約價	內容物
成人口罩		125 元/盒	■一盒 50 入裝
		~員診備有 10 萬個口罩庫存量可供使用~	
MERS 包		33 元/包	■口罩 3 入 ■乾洗手液 1 瓶 ■酒精棉片 2 片
隔離衣		350 元/組	■10 件/組
手套		95 元/盒	■100 個/盒 ■型號:S、M、L

旅遊防疫中心 敬啟
(疫情諮詢專線：03-6669996#22)

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV) 竹科員診救護車到廠區就醫流程圖

竹科員工診所 2015.6.4 制定



※專責醫務室診間的環境清潔與消毒作業人員，穿著上述內容之個人防護裝備來進行作業。

※救護車作業人員，穿著上述內容之個人防護裝備來進行救護作業；載送疑似個案就醫後以漂白水或酒精清潔消毒。